

I CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO LITORAL SUL DE PERNAMBUCO

I.1 LOCALIZAÇÃO, ÁREA E POPULAÇÃO

Abrangendo sete municípios litorâneos do Estado, o Setor Sul do Litoral Pernambucano totaliza 2 097 km² ou o equivalente a 2,13% da superfície estadual. Compõem o referido Setor os municípios de Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros e São José da Coroa Grande (MAPA 01). Esses municípios integram também as microrregiões Mata Meridional Pernambucana e Suape, detendo 44,30% da área da primeira e a totalidade da área da segunda.

Com uma população total de 291 653 habitantes em 1991 (IBGE), esses municípios detinham, então, 4,09% do contingente demográfico estadual e contribuíam com 44,34% da população total e 46,35% da população urbana das microrregiões acima referidas, participação essa que tende a aumentar na medida em que tais populações apresentaram, no período 1970-1991, taxas de crescimento de, respectivamente, 1,8 e 3,9% ao ano no Litoral Sul contra 1,2 e 3,1% naquelas microrregiões.

I.2 RELEVO E GEOLOGIA

Dotado de um quadro natural em grande parte diverso daquele do Setor litorâneo Norte, o Litoral Sul de Pernambuco tem como traço característico de sua paisagem um relevo marcado pela predominância de *morros* e *colinas* cujas altitudes variam, em média, de 30 a mais de 400 metros no primeiro caso e de 12 a pouco mais de 50 metros, no segundo, configurando o topo dessas elevações um plano ascendente que se eleva dos limites da Planície Costeira, onde compõem um modelado suave ondulado, para a extremidade oeste da área onde, em geral, adquirem a feição de relevo montanhoso.

Os *morros* são formas de relevo modeladas em rochas muito antigas, constitutivas do *Embasamento Cristalino*, ao passo que as *colinas* foram modeladas em estruturas mais recentes que a anteriormente referida, pertencentes às *Formações Barreiras, Cabo, Algodois e Ipojuca*. Permeando morros e colinas, ocorrem *planícies fluviais* formadas pelas várzeas e terraços dos rios que cortam a área.

A leste desses relevos, separando-os da linha de costa, encontra-se a *Planície Costeira*, de largura variável, origem sedimentar e altitude que oscila entre 0 e 10 metros. Produto da ação combinada dos rios e do mar, a *Planície Costeira* apresenta um conjunto de feições onde sobressaem *praias, restingas* (terraços marinhos), *manguezais* (formações palustres ou lamacentas), *várzeas fluviais permanentemente alagadas, várzeas e terraços que margeiam o curso terminal dos rios* cujas desembocaduras, em geral amplas, interrompem praias e restingas e permitem o fluxo e refluxo diário das marés através do leito fluvial, originando o fenômeno conhecido como *afogamento do estuário*, responsável pela ocorrência, na área, de extensos manguezais.